

Tar din anhörig sin medicin?

Antipsykotiska läkemedel är inte bara avsedda att göra din anhörig bättre utan även att hålla sig frisk. Det betyder att din anhöriga måste fortsätta med medicineringen även när den börjar må bättre. Anledningar att medicinen inte tas:

- Man känner sig återställd, vilket är bra och själva målsättningen med behandlingen, men detta kan förändras snabbt om man slutar med sin medicin. Diskutera alltid dessa funderingar med sjukvården.
- Biverkningarna är besvärande – om så är fallet ska ni prata med psykiatrisjuksköterskan eller psykiatern. Det kan gå att ändra dos eller byta till ett annat läkemedel.
- Medicineringen känns besvärlig att komma ihåg – även det bör tas upp med någon vårdansvarig. De kan då föreslå ett läkemedel som är lättare att komma ihåg tex en injektion med två till fyra veckors mellanrum.
- Man tror att det är medicinen man blir sjuk av – psykosläkemedel har biverkningar men orsakar inte symtom som är förenligt med psykosjukdom.
- Det kan vara svårt att komma ihåg att ta sin medicin. Psykosjukdom är delvis en "tankesjukdom" och närminnet kan ibland svika en. Här är det bra att det finns någon som påminner om att dagligen ta medicinen alternativt att man tar en injektion med jämna intervall där sjukvården hjälper att kalla till besök för medicinering.